

РЕКСОД  
инструкция по применению

**Клинико-фармакологическая группа**

Антиоксидантный препарат

**Форма выпуска, состав и упаковка**

<i>Лиофилизат для приготовления раствора для в/в введения</i>	<b>1 фл.</b>
супероксиддисмутаза	1.6 млн. ЕД

флаконы (5) - поддоны картонные (1) - пачки картонные.  
ампулы (5) - поддоны картонные (1) - пачки картонные.

<i>Лиофилизат для приготовления раствора для в/в введения</i>	<b>1 фл.</b>
супероксиддисмутаза	3.2 млн. ЕД

флаконы (5) - поддоны картонные (1) - пачки картонные.  
ампулы (5) - поддоны картонные (1) - пачки картонные.

**Показания**

— комплексная профилактика развития интраоперационных осложнений при эндопротезировании крупных суставов, с использованием костного цемента.

**Противопоказания**

- возраст до 18 лет;
- [беременность](#);
- период лактации;
- повышенная чувствительность к препарату.

**Дозировка**

В/в, капельно, во время операции, перед использованием костного цемента. 9.6 млн ЕД предварительно растворенных в 100 мл физиологического раствора за 10-15 мин.

Готовый раствор использовать непосредственно после приготовления, не смешивать с другими лекарственными средствами.

Применение [Рексод](#) не является противопоказанием к применению других препаратов.

**Побочные действия**

Возможны аллергические реакции. Для иных препаратов супероксиддисмутаза описаны случаи развития анафилактических реакций (в т.ч. [шок](#)).

### **Передозировка**

Препарат не токсичен. Случаи передозировки неизвестны.

### **Лекарственное взаимодействие**

Клинически значимых взаимодействий препарата не описано. При эндопротезировании крупных суставов терапевтическая эффективность препарата показана при комбинированном введении Рексод с препаратами фумарата натрия.

### **Беременность и лактация**

Противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан пациентам в возрасте до 18 лет.

### **Условия отпуска из аптек**

Препарат отпускается по рецепту.

### **Условия и сроки хранения**

Хранить при температуре от 4° до 10°C. Хранить в местах, недоступных для детей. Срок годности - 2 года. Не применять по истечении срока годности.

### **Производитель/Место производства**

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов» Федерального медико-биологического агентства (ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России).

Претензии потребителей и рекламации на физические и другие свойства препарата направлять в адрес предприятия-производителя:

197110, г. Санкт-Петербург, ул. Пудожская, д. 7, ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России,

Тел +7(812) 2304203, E-mail: mark@hpb-spb.com